

SLOVENSKÁ TRANSPLANTOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

Výbor Slovenskej transplantologickej spoločnosti

Prezident

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC

Viceprezident

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

Vedecký sekretár

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Členovia

Dr. h.c. prof. MUDr. Ján Breza, PhD., DrSc., MPH, MHA

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD., FESC

MUDr. Martin Chrástina, PhD., CETC

prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

MUDr. Daniel Kuba, PhD.

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

MUDr. Eva Lacková, PhD.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

18. februára 2021

Stanovisko Výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS k očkovaníu proti ochoreniu COVID-19 u pacientov po transplantácii solídnych orgánov – 1. AKTUALIZÁCIA

Slovenská transplantologická spoločnosť dôrazne odporúča očkovanie proti COVID-19 u všetkých pacientov po transplantácii solídnych orgánov v čo najkratšom čase podľa aktuálnej očkovacej stratégie MZ SR uverejnenej na korona.gov.sk.

Slovenská transplantologická spoločnosť odporúča očkovanie pacientov po transplantácii solídnych orgánov ktoroukoľvek schválenou a odporúčanou vakcínou s výnimkou živej vakcíny.

Nadálej dôrazne odporúčame očkovanie u všetkých pacientov na čakacích listinách. Očkovanie je vysoko odporúčané aj členom domácností pacientov po transplantácii alebo v čakacích listinách. U všetkých pacientov vrátane zaočkovaných odporúčame naďalej dôsledne dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

Odporúčame očkovanie po podaní biologickej liečby v časovom horizonte troch mesiacov od ukončenia liečby. V prípade transplantácie u neočkovaného pacienta je vhodné očkovanie o 1-3 mesiace po transplantácii. V prípade transplantácie pacienta,



UNLP

Trieda SNP 1

040 66

Košice

Slovensko

TELEFÓN 055/6404182

FAX 055/6403778

E-MAIL transplant@transplant.sk

WEBOVÁ LOKALITA
www.transplant.sk

ktorý bol očkovaný len 1. dávkou vakcíny, je nutné podať 2. dávku o 1-3 mesiace po transplantácii.

Podľa stanoviska Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie nie je nutná kontrola účinnosti vakcíny pomocou stanovenia postvakcinačných protilátok. Toto vyšetrenie nemá na základe súčasných vedomostí a odporúčaní žiaden dopad na ďalší manažment pacienta a naopak, môže viesť k nesprávnym záverom a v prípade nevytvorenia dostatočnej koncentrácie protilátok aj k vzostupu nedôvery k očkovaniu, ktoré má pritom komplexný efekt a vedie k reakcii vo viacerých oblastiach imunitného systému, nielen k tvorbe protilátok.

Prítomnosť protilátok v sére pacientov po prekonanej infekcii by nemala byť dôvodom na odklad očkovania, ktoré je možné zrealizovať v prípade asymptomatickej formy 7 dní od ukončenia karantény a v prípade symptomatickej formy 14 dní od ukončenia karantény.

Zvažovaná liečba vírus - neutralizujúcimi monoklonálnymi protilátkami v začiatkových prednemocničných štádiách infekcie bude v prípade ich registrácie európskou liekovou agentúrou postupom, ktorý STS u pacientov po transplantácii tiež odporučí.

Odporúčame tiež kolegom zo všetkých zdravotníckych zariadení, ktorí sa podieľajú na liečbe COVID19 u transplantovaných pacientov, aby ohľadom manažmentu imunosupresívnej liečby kontaktovali spádové transplantáčne centrá.

Za výbor STS,

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC – prezident STS

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA – viceprezident STS

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. – vedecký sekretár STS

Zdroje:

https://www.ssaki.eu/wp-content/uploads/2021/01/6_INFOLETTER_PROTILATKY.pdf

https://www.ssaki.eu/wp-content/uploads/2021/01/7_INFOLETTER_CD20.pdf

https://www.ssaki.eu/wp-content/uploads/2021/02/8_INFOLETTER_VAC_RESP.pdf



UNLP
Trieda SNP 1
040 66 Košice
Slovensko

TELEFÓN 055/6404182
FAX 055/6403778
E-MAIL transplant@transplant.sk
WEBOVÁ www.transplant.sk
LOKALITA